

## Лучшая защита от менингококковой инфекции – вакцинация.

В России вакцинация против менингококковой инфекции проводится в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок.

Ей подлежат дошкольники перед поступлением в детские учреждения, дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, лица из групп высокого риска инфицирования.

### Схема вакцинации:

Детям с 9 месяцев до 2-х лет – 2 введения вакцины с интервалом не менее 3 месяцев.

Детям с 2-х лет и взрослым – 1 введение.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1  
e-mail: [cgon@cgon.ru](mailto:cgon@cgon.ru);  
тел.: 8 (499) 241 86 28



## МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



## Менингококковая инфекция – опасная для жизни, часто молниеносная инфекция.

**Путь передачи** – воздушно-капельный, реже - контактно-бытовой.

**Источник** – больной человек или носитель.

Инфицирование происходит, как правило, при тесном контакте, когда расстояние между людьми составляет менее 1 метра.

Течение и форма инфекции непредсказуемы. В некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно или в форме назофарингита.



**Возбудитель – *Neisseria meningitidis* или менингококк**

## Симптомы при легких формах схожи с обычной ОРВИ:

лихорадка, слабость, насморк.

### Наиболее тяжелые формы менингококковой инфекции – менингит и сепсис.

При менингококковом менингите отмечается сильнейшая головная боль, светобоязнь, напряженность мышц шеи, тошнота.

При сепсисе (попадании менингококка в кровяное русло) – лихорадка, бледность кожи, сыпь на коже, похожая на кровоизлияния.



## Осложнения менингококковой инфекции очень тяжелые:

судороги, снижение слуха или глухота, парезы или ампутация конечностей.

При септической форме болезни:

- летальность составляет 15%, а у детей до года и лиц старше 65 лет - более 30%,
- инвалидизация наступает в 10-15% случаев.

### Дети рискуют больше.

Чем младше ребенок, тем выше риск летального исхода. Смерть может наступить уже через 24-48 часов после появления симптомов, а иногда еще быстрее.

